



Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuorjuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Rimuovere il tappo dello SWIPPER™ dall'unità di test.



Campionare la sostanza o compressa sospetta con il tappo dello SWIPPERTM.



Rimettere il tappo dello SWIPPER™ nella provetta. Premere con decisione.




Non continuare Ī che il tappo SWIPPERTM non sia adeguatamente fissato.

Attenzione: kit contiene un

Assicurarsi di seguire tutte procedure di sicurezza.

Identificazione

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe




Agitare delicatamente test su e giù per sicurarsi che il assicurarsi liquido tocchi il tappo.



La comparsa di un colore violetto brillante indica la presenza di Ecstasy /MDMA, MDA, MDE, o MBDB.

Il colore può impiegare fino a 3 minuti per svilupparsi.



La comparsa di un colore giallo indica la presenza di "Sali da Bagno" quali MDPV, Metilone o Butilone.



Se <u>non</u> si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le droghe sopra elencate non sono presenti.

氤 Smaltimento Diluire il reagente con dell'acqua di rubinetto, prima di gettare il kit nei rifiuti.



enta

Prodotto da IDenta Ltd www.identa-corp.com Tecnologia brevettata • Prodotto in Israele LOT: SW4013125A

EXP: 09/2028